



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOME LEGÍVEL: _____

NÚMERO DE RG: _____

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PROVA PARA CARGO DE

ENFERMEIRO 40 HORAS

**ATENÇÃO: CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDENTE AO CARGO QUE VOCÊ
CONCORRE. LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES CONSTANTES NA CAPA DE
SEU CADERNO DE QUESTÕES.**

- Aguarde a orientação do aplicador para iniciar a prova.
- Leia, atentamente, as questões e atenha-se a elas, pois os fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos.
- Duração da Prova: Três horas (3 horas). O candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 60 (sessenta) minutos, contados a partir do seu efetivo início.
- Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si.
- Utilize somente caneta esferográfica preta para assinalar a folha de respostas.
- Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo quadrado que contém a letra escolhida da questão pertinente, não deixando nenhum espaço em branco. Exemplo: A B C D
- Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
- Ao término da prova entregue o gabarito e caderno de questões.
- Preencha claramente os dados na folha de resposta e assine.
- Somente poderá ausentar-se da sala da prova acompanhado do fiscal volante.
- Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.

Assinatura do candidato

1. Uma criança recebeu a vacina BCG-ID na Unidade Básica de Saúde (UBS) no 5o dia de vida. Quarenta dias após a vacinação, a mãe retorna com a criança à UBS porque percebeu nódulos endurecidos no mesmo braço, próximo à axila, que inicialmente eram pequenos pontos que foram aumentando de tamanho. No local da aplicação da vacina, há uma endureção semelhante, sem a cicatriz típica da vacina. A mãe relata que não ocorreu a “ferida da vacina”, conforme havia sido orientado no momento da aplicação. O diagnóstico e a conduta corretos são, respectivamente:

- a) ausência de relação temporal que apoie evento adverso de vacinação; encaminhar ao pediatra para investigação de doença ganglionar;
- b) falha na vacinação; revacinar e registrar no cartão da criança;
- c) reação de ansiedade relacionada à vacinação; acalmar a mãe e orientar que algumas crianças realmente não desenvolvem a ulceração pós-vacinação com BCG-D;
- d) evento adverso pós-vacinação; notificar o EVAP e acompanhar, e orientar retorno, pois pode ocorrer supuração. Não há indicação de tratamento com Isoniazida.

2. Uma criança com um 1 ano e 3 meses viveu no exterior do Brasil dos sete aos 12 meses, quando retornou ao país. No momento da viagem para o exterior, estava com a situação vacinal em dia e, no período em que esteve fora, não recebeu qualquer dose de vacina, exceto a de febre amarela, que foi exigida dez dias antes do embarque de volta. De acordo com o calendário de vacinação da criança de zero a seis anos do Estado de São Paulo, a conduta correta para o atendimento hoje é:

- a) reiniciar o esquema de vacinação, porque a criança está em atraso vacinal desde os sete meses de vida;
- b) administrar todas as vacinas em atraso desde a última dose recebida e agendar retorno para os reforços programados para os 4 anos de idade;
- c) administrar todas as vacinas em atraso programadas para os 12 e 15 meses de idade e agendar retorno em 30 dias para completar o esquema previsto para a idade atual;
- d) não vacinar. Aguardar 28 dias de intervalo recomendado em virtude da vacina contra febre amarela recebida antes do embarque;

3. Para o enfrentamento do aumento de casos de coqueluche em crianças com idade inferior a seis

meses, a vacina dpTa (tríplice bacteriana acelular) foi incluída no calendário vacinal da gestante. Essa vacina está indicada para mulheres:

- a) sem vacinação prévia à gestação: duas doses de dupla adulto, com intervalo de no mínimo 30 dias e complementar com a dTpa a partir da 27a semana de gestação;
- b) sem vacinação prévia à gestação: três doses de dTpa com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, entre a 27a e a 36a semana de gestação;
- c) com história prévia de esquema completo com dT: reiniciar o esquema vacinal com duas doses de dT e duas de dTpa, até a 27a semana de gestação;
- d) com história prévia de vacinação com dT há mais de 2 anos;

4. A supervisão de enfermagem pode ser definida como uma ação de comunicação direta entre supervisor e supervisionado no âmbito da execução do trabalho, pertinente ao gerenciamento dos recursos humanos. Seu produto tem como finalidade direta as ações de:

- a) educação em serviço.
- b) educação em saúde.
- c) medidas disciplinares.
- d) plano de carreira.

5. Homem, 67 anos, portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), deu entrada no pronto socorro com quadro de agravamento. Para o diagnóstico de enfermagem “Troca de gases prejudicada relacionada à desigualdade de ventilação e perfusão”, o enfermeiro posiciona o paciente em decúbito elevado, reduzindo o esforço respiratório, monitora SpO2 por oxímetro e inicia oxigenoterapia por cateter, se o nível observado for

- a) > 95%.
- b) > 90%.
- c) ≤ 90%.
- d) < 85%.

6. No exame físico do recém-nascido, o enfermeiro utiliza, como referência de normalidade, a relação entre o perímetro cefálico e o torácico, em que o perímetro cefálico

- a) é maior do que o torácico ao nascer e se iguala a ele aos três meses de vida.
- b) é maior do que o torácico ao nascer e se iguala a ele aos seis meses de vida.
- c) se equivale ao torácico ao nascer e aumenta após os seis meses de vida.

d) é menor do que o torácico ao nascer e se iguala a ele aos três meses de vida.

7. O exame clínico das mamas – ECM – possibilita identificar anormalidades que contribuem para a detecção precoce do câncer de mama. A seu respeito, está correto afirmar que:

- a) o ECM tem alta sensibilidade para detecção de tumores de mama em todas as fases de desenvolvimento.
- b) o exame é composto por dois tipos de inspeção: a estática ou inspeção visual e a dinâmica, em que ocorre a palpação.
- c) a pele com aspecto de casca de laranja e a proeminência venosa constituem achados de normalidade anatômica.
- d) a detecção de linfonodos duros e pouco móveis ou descarga papilar espontânea e unilateral, aquosa ou não, constitui sinal de alerta para prosseguimento da investigação.

8. Adulto de 56 anos, IMC 28 kg/m², PAS 140mmHg – PAD 90mmHg. Na consulta de Enfermagem, deverá ser orientado em relação ao tratamento não medicamentoso com ênfase na perda de peso, tendo como meta IMC entre 20 e 24 kg/m². A perda ponderal é uma diretriz no tratamento não medicamentoso porque:

- a) é a conduta com maior impacto para redução dos níveis pressóricos.
- b) é uma condicionante para o paciente iniciar atividades físicas regulares.
- c) impede a instalação de comorbidades como Diabetes mellitus.
- d) eleva a autoestima do paciente.

9. A depressão incide em todos os grupos etários de uma população, e sua evolução e desfecho podem ser modificados se a doença for diagnosticada precocemente. Por essa razão, o enfermeiro da Atenção Básica deve estar atento aos sinais de depressão, entre eles:

- a) alucinações olfativas.
- b) repetição de comportamentos ritualistas.
- c) catatonia.
- d) isolamento social.

10. A intoxicação oral por chumbinho (carbamato) é uma condição clínica emergencial que tem grande tendência à alta mortalidade relacionada ao

diagnóstico tardio e à conduta inadequada dos profissionais de saúde. A intervenção específica no atendimento emergencial nesses casos inclui

- a) enema com solução fisiológica.
- b) alimentação parenteral por bomba de infusão.
- c) sondagem nasogástrica e aplicação de carvão ativado.
- d) posicionamento do paciente em decúbito lateral.

11. Ao adentrar à casa, uma enfermeira se deu conta da vulnerabilidade da família. Suas necessidades básicas não estavam sendo atendidas, e as mudanças necessárias poderiam demorar. Essa reflexão sobre a visita domiciliar a um idoso acamado caracteriza a visita domiciliar como instrumento de enfermagem para:

- a) certificar a real exclusão social da clientela.
- b) agendar consultas médicas e de enfermagem.
- c) contextualizar o plano terapêutico familiar.
- d) relacionar as patologias que acometem a família.

12. A vacinação do idoso em domicílio, inclusive de idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural, é desenvolvida pelos serviços de Atenção Básica em razão de:

- a) ser um direito, garantido no Estatuto do Idoso, referente ao atendimento domiciliar, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover.
- b) ser um dispositivo do Programa Nacional de Imunização, restrito à vacinação anual contra Influenza.
- c) ser uma atribuição específica das equipes de saúde que atuam na Estratégia Saúde da Família, que abrange idosos residentes dentro dos limites da área adscrita.
- d) ser um dispositivo da política nacional de humanização do Sistema Único de Saúde – SUS, que reconhece as condições iníquas de saúde e vida dos idosos nas áreas de exclusão social.

13. Com base na Portaria no 1.271, de 6 de junho de 2014, que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, é correto afirmar que:

- a) a comunicação dos agravos de notificação compulsória também deve ser realizada pelos responsáveis por estabelecimentos privados educacionais e instituições de pesquisa.
- b) o registro dos agravos de notificação compulsória deve ser feito prioritariamente pelos médicos.
- c) a notificação compulsória imediata deve ser feita até 12 horas após a confirmação diagnóstica do agravo.
- d) só são de notificação obrigatória os casos de dengue que levem à morte.

14. Ao preparar e administrar um medicamento, a enfermeira deve ter em mente quais são as finalidades terapêuticas para o paciente. Assim, quando for administrar drogas do tipo nitroglicerina sublingual e agentes bloqueadores beta-adrenérgicos usados para pacientes com problemas coronarianos, deve saber que:

- a) relaxam as artérias do coração, favorecendo redução de dor.
- b) bloqueiam a distensão miocárdica.
- c) provocam elevação de pressão arterial e venosa.
- d) restabelecem a pressão negativa intratorácica.

15. Ao preparar e administrar um medicamento, a enfermeira deve ter em mente quais são as finalidades terapêuticas para o paciente. Assim, quando for administrar drogas do tipo nitroglicerina sublingual e agentes bloqueadores beta-adrenérgicos usados para pacientes com problemas coronarianos, deve saber que:

- a) bloqueiam a distensão miocárdica.
- b) relaxam as artérias do coração, favorecendo redução de dor.
- c) provocam elevação de pressão arterial e venosa.
- d) restabelecem a pressão negativa intratorácica.

Analise a situação a seguir para responder às questões de números 16 e 17. Durante a consulta de Enfermagem feita na unidade de saúde, a enfermeira obteve a informação de que a paciente Maria, 60 anos, apresentava perda urinária por tosse ou espirro. A informação foi devidamente registrada como um problema de Enfermagem, sendo registrada no relatório como uma incontinência urinária. No planejamento do cuidado à profissional, fez menção sobre ensinar exercícios de fortalecimento da região perineal da paciente.

16. O tipo de problema apresentado pela senhora Maria é identificado como incontinência de:

- a) retenção.
- b) esforço.
- c) urgência.
- d) emergência.

17. A ação educativa proposta pela enfermeira é conhecida como exercício de:

- a) Kegel.
- b) Pinard.
- c) Briquet.
- d) Leopold.

18. Está correto priorizar, no plano de cuidados de enfermagem, o uso de:

- a) insulina, a pressão arterial, a alimentação, a hidratação e a glicemia capilar.
- b) insulina, a pressão arterial, a alimentação, a pele e as mucosas hipocoradas.
- c) insulina, a pressão arterial, a alimentação, a diminuição da acuidade visual.
- d) insulina, as unhas dos pés sujas e mal cortadas, e a acuidade visual.

19. Paciente com suspeita de meningite necessita ser encaminhado para Ressonância Magnética. Em se tratando de uma doença infectocontagiosa, para o adequado transporte do paciente deverá ser observado o seguinte:

- a) o funcionário que encaminha o paciente deve utilizar máscara cirúrgica, e o paciente não.
- b) o funcionário que encaminha e o paciente deverão usar a máscara cirúrgica.
- c) apenas o paciente deverá usar a máscara cirúrgica.
- d) a Ressonância desse paciente deverá ser a última a ser feita, para que o paciente não tenha mais contato com ninguém.

20. Medicamento prescrito: 2 000 000UI de penicilina cristalina EV 4/4h, diluída em 8 mL de soro fisiológico 0,9%. Temos frasco ampola 5 000 000UI. Quantos mL devem ser aspirados?

- a) 2,0 mL.
- b) 2,5 mL.
- c) 3,0 mL.
- d) 4,0 mL.

21. Na assistência de Enfermagem de um paciente com dreno de tórax, devido a pneumotórax, o principal cuidado está relacionado a:

- a) manter a ponta distal do dreno sob o selo d'água.
- b) manter o paciente em decúbito dorsal.
- c) colocar o frasco coletor no mesmo nível do tórax.
- d) colocar o paciente deitado do lado esquerdo.

22. Observe o quadro e relacione as drogas e as reações adversas de modo a tornar verdadeira a associação.

Drogas	Reações Adversas
A. Salbutamol	I) Ressecamento Nasal, alteração do paladar.
B. Haloperidol	II) Hipersalivação, Hiperpirexia e Anemia
C. Diazepan	III) Incontinência, Dependência física e psíquica

Assinale a alternativa correta:

- a) a – III, b – II, c – I.
- b) a – II, b – III, c – I.
- c) a – I, b – II, c – III.
- d) a – II, b – I, c – III.

23. São exemplos de drogas incompatíveis com a diluição em soro fisiológico a:

- a) anfotericina B e a fenitoína sódica.
- b) penicilina G potássica e o sulfato de magnésio a 10%.
- c) vancomicina e a heparina sódica.
- d) dipirona e a dopamina.

24. No que diz respeito à Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE, é correto afirmar:

- a) o processo de enfermagem organiza-se em quatro etapas inter-relacionadas: coleta de dados, avaliação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem e prescrição de enfermagem.
- b) ocorrendo a prestação de cuidados profissionais de enfermagem, a implementação da SAE é obrigatória nos serviços públicos e facultativa nos serviços privados.
- c) a fase de avaliação de enfermagem corresponde a coleta de dados e realização do exame físico do paciente/ cliente.

d) em locais como ambulatórios e escolas, o Processo de Saúde em Enfermagem corresponde à Consulta de Enfermagem

25. Considere as afirmações a seguir sobre alguns dos cuidados que devem compreender a assistência de enfermagem a um paciente que apresenta reação transfusional, e classifique cada uma delas como verdadeira (V) ou falsa (F).

() Após interromper a infusão do sangue, o acesso venoso deve ser mantido com solução de Ringer lactato.

() A bolsa de sangue e o equipo utilizados, juntamente com a identificação do paciente, devem ser enviados para cultura.

() O banco de sangue deve ser notificado sobre a ocorrência de reação transfusional.

Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta, de cima para baixo.

- a) F, V, V.
- b) F, F, F.
- c) F, V, F.
- d) V, F, F.

26. Para realizar, de modo seguro, o transporte de um paciente com dreno de tórax em uso de sistema de drenagem com selo d'água, é necessário:

- a) manter o sistema de drenagem clampeado durante o transporte.
- b) manter o sistema de drenagem abaixo do nível do tórax.
- c) desconectar o sistema de drenagem do paciente após o clampeamento e proteção do dreno com gaze.
- d) manter o sistema de drenagem, clampeado ou não, acima do nível do tórax.

27. Para a avaliação neurológica de uma vítima de queda da escada, a enfermeira aplicou a Escala de Coma de Glasgow, que é feita com base nos indicadores de:

- a) avaliação pupilar, tônus muscular e melhor resposta verbal.
- b) abertura ocular, padrão respiratório e força muscular.
- c) movimentos oculares, reflexo corneopalpebral e tônus muscular.
- d) abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora.

28. No atendimento de primeiros socorros à vítima de queimadura por substância química, a irrigação da área afetada com soro fisiológico está contraindicada quando o agente causador é:

- a) soda cáustica em pó.
- b) fogo.
- c) choque elétrico.
- d) gelo seco.

29. Frente a um indivíduo que apresenta entre outros sinais e sintomas: pele avermelhada, com prurido ou queimação; edema de face e língua; respiração ruidosa e difícil devido ao edema das cordas vocais; hipotensão, palidez e tontura, o enfermeiro socorrista deve suspeitar que se trata de um caso de choque:

- a) hipovolêmico.
- b) psicogênico.
- c) anafilático.
- d) neurogênico.

30. Constitui contraindicação à imunização com vacinas de bactérias atenuadas ou vírus atenuados, entre outros fatores:

- a) estar em tratamento com quimioterápico antineoplásico.
- b) fazer uso tópico, há mais de dez dias, de produtos à base de corticoide.
- c) apresentar história de tratamento pregresso para tuberculose.
- d) desnutrição.

31. Após confirmação de caso de rubéola em uma escola, visando ao bloqueio da transmissão da doença, a enfermeira da Unidade de Saúde da Família organizou uma visita à instituição para imunizar os contatos. Para a perfeita conservação, as vacinas deverão ser acondicionadas em caixas térmicas e mantidas em temperatura de:

- a) – 20 °C a 0 °C.
- b) – 2 °C a + 4 °C.
- c) 0 °C a + 8 °C.
- d) + 2 °C a + 8 °C.

32. A.A., 26 anos, sexo feminino, compareceu à unidade de saúde apresentando mordedura de cachorro na coxa direita. Ao ser questionada informou que o animal, que se apresentava saudável, pertencia ao vizinho que a acompanhava. Após avaliação da vítima, a enfermeira procedeu à lavagem e cuidado da

ferida. Por se tratar de área de raiva controlada, no que diz respeito à prevenção da doença, deve-se:

- a) dispensar a usuária para casa orientando-a sobre os cuidados com o curativo da lesão.
- b) orientar sobre a necessidade de observar o animal por dez dias, e, caso este venha a adoecer ou sumir, procurar imediatamente o serviço de saúde para iniciar o tratamento profilático da raiva.
- c) solicitar carteira de vacinação do animal, e, caso este não seja imunizado contra a raiva ou a vacina esteja em atraso, aplicar uma dose da vacina antirrábica em A.A.
- d) iniciar o esquema de três doses com a vacina antirrábica Fuenzalida & Palácios, aplicando a primeira dose imediatamente e agendando a segunda e terceira doses com intervalos de dez dias entre as aplicações.

33. Em 20 de junho de 2013, P.A., 27 anos, D.U.M = 05.05.2013, compareceu à unidade de saúde da família (USF), para consulta de enfermagem, com queixa de atraso menstrual. Mostrava-se muito ansiosa, porque já havia tido um aborto. A enfermeira que a atendeu realizou o teste para gravidez que deu positivo. Nessa oportunidade, ao calcular a idade gestacional (IG) e a data provável de parto (DPP), a enfermeira obteve :

- a) IG = 5 6/7 semanas e DPP = 20.02.2014.
- b) IG = 6 semanas e DPP = 12.02.2014.
- c) IG = 6 1/7 semanas e DPP = 05.02.2014.
- d) IG = 6 4/7 semanas e DPP = 12.02.2014.

34. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à hanseníase.

- a) a gravidez e o aleitamento contraindicam o tratamento poliquimioterápico (PQT) para a doença.
- b) o paciente de hanseníase deverá ser agendado para a tomada da dose supervisionada a cada sete dias.
- c) entre os principais sinais e sintomas da doença pode ser citada a diminuição ou queda de pelos, localizada ou difusa, especialmente em sobrancelhas.
- d) deve ser considerado como contato intradomiciliar toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o doente de hanseníase nos últimos seis meses.

35. Considere as afirmações a seguir sobre aspectos da supervisão em enfermagem, e classifique cada uma delas como verdadeira (V) ou falsa (F).

() entre outras atividades, o supervisor desenvolve, junto aos funcionários, atividades diversificadas, tais

como a promoção da integração do pessoal de enfermagem e manutenção de estratégias para sua motivação.

() uma política de trabalho, centralizada, autoritária e trefista, que não estimula a participação dos funcionários dificulta a supervisão.

() a recusa no atendimento a solicitações de férias, folgas e transferências, a ausência de autonomia e o despreparo do elemento supervisor são exemplos de situações geradoras de tensão no ambiente de trabalho.

() uma supervisão eficaz resulta, entre outras condições, na manutenção de um nível elevado na qualidade da assistência de enfermagem e na satisfação do cliente, dos familiares e dos funcionários. A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) V, V, V, V.
- b) V, F, V, F.
- c) V, V, V, F.
- d) F, V, V, F.

36. No enfisema pulmonar panlobular, estão envolvidos alguns processos fisiológicos relacionados à árvore respiratória, entre os quais:

- a) insuflação pulmonar aumentada por alteração do fluxo expiratório.
- b) insuflação pulmonar reduzida por alteração do fluxo inspiratório.
- c) obstrução de vias aéreas superiores relacionada à fibrose brônquica.
- d) redução dos espaços aéreos das vias respiratórias por carência de antielastase.

37. As geo-helmintíases constituem um grupo de doenças parasitárias intestinais que acometem o homem e são causadas principalmente por:

- a) Schistosoma mansoni e Trypanosoma cruzi.
- b) Ascaris lumbricoides e Leishmania chagasi.
- c) Ascaris lumbricoides, T. trichiura e ancilostomídeos.
- d) Ancilostomídeos, leptospiras e microfilárias.

38. Analise as seguintes afirmações sobre ética em enfermagem, classificando cada uma em verdadeira (V) ou falsa (F):

() o Código de Processo Ético-Disciplinar da Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN 370/10 estabelece as normas procedimentais para serem aplicadas nos processos éticos em toda jurisdição de todos os Conselhos de Enfermagem.

() uma penalidade aplicada a um profissional de enfermagem que infringiu o Código de Ética substitui a eventual responsabilização resultante de condenação pelo Código Penal, pois ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime.

() um auxiliar ou técnico de enfermagem condenado por infração ética leva à punição com pena igual o enfermeiro que responde tecnicamente pelo setor onde a infração ocorreu.

() o zelo pela segurança do paciente está descrito entre os deveres e responsabilidades da enfermagem no seu Código de Ética.

A classificação correta do julgamento das afirmações, de cima para baixo, é:

- a) V, F, V, F.
- b) V, F, F, V.
- c) V, V, F, F.
- d) F, V, F, V.

39. A lei do exercício profissional de enfermagem diz que é livre o seu exercício em todo o território nacional desde que:

- a) o profissional esteja inscrito no Conselho Regional de Enfermagem onde o exercício ocorre.
- b) o profissional de enfermagem seja portador de diploma conferido por instituição de ensino superior.
- c) o profissional não esteja inscrito em mais de um quadro funcional concomitantemente.
- d) os profissionais ocupem cargo de enfermeiro, obstetrites, técnicos, auxiliares de enfermagem ou agentes comunitários de saúde.

40. "...talvez pareça estranho enunciar como primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente..." (Florence Nightingale, 1859)

Esta célebre frase corresponde a qual dos princípios da ética?

- a) autonomia.
- b) alteridade.
- c) beneficência.
- d) não maleficência.